

شبکه آموزشی پژوهشی ایران - مادسیج



پرسشنامه استاندارد تحقیق

شبکه آموزشی پژوهشی مادسیج Madsg.com



دانلود سریع پس از پرداخت (اتوماتیک)

پشتیبانی سریع و ۲۴ ساعته
madsg.com@gmail.com

روایی و پایایی

تفسیر، کلید و تحلیل

مولفه و مدل پرسشنامه

تعاریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه

آموزش و راهنمایی وارد کردن پرسشنامه در spss

بسمه تعالی

مقیاس درجه بندی
اضطراب هامیلتون
(HRSA)



موسسه تحقیقاتی علوم رفتاری سینا (روان تجهیز)
طراح و تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی روان شناسی و آزمون های روان شناختی
تهران - بزرگراه شهید باقری - بین رسالت و فرجام - ضلع غربی بزرگراه - نبش گلستان یکم - شماره ۶۰
تلفن ۷۷۲۹۷۲۲۳ ۷۷۲۹۷۲۲۳ شماره ۶۰-۶۴۹-۷۷۲
Site: WWW.ravantajhiz.ir



مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)

این مقیاس در سالهای بین ۱۹۶۰ و ۱۹۶۷ توسط ماکس هامیلتون (۱) ساخته شده و برای ارزیابی شدت اضطراب جزو مقیاس های بالینی قرار گرفت. در حال حاضر این آزمون از شناخته شده ترین آزمون های اضطراب محسوب می شود.

توصیف آزمون

مقیاس درجه بندی هامیلتون شامل ۱۴ مورد بوده و هر مورد در ارتباط با علائم خاص اضطراب می باشد. در این آزمون که توسط درمانگر نمره گذاری می شود، هر مورد ۵ رتبه داشته که حسب شدت علائم از صفر تا ۴ نمره می گیرد. صفر نشان دهنده عدم وجود آن علامت و ۴ نشان دهنده شدت همان علامت در بیمار می باشد. این مقیاس توسط یک فرد مصاحبه گر، درجه بندی می شود. هامیلتون اطلاعات لازم برای تکمیل این پرسشنامه را از طریق مصاحبه، تاریخچه، وابستگی، و مشاهده بدست می آورد. این مقیاس طیف وسیعی از علائمی را در بر می گیرد که معمولاً به عنوان علائم یک حالت اضطرابی تشخیص داده می شوند. این علائم عبارتند از: خلق مضطرب، تنش، ترس، بی خوابی، اشکال در تمرکز، خلق افسرده، تنش عضلانی (تیک، یا لرزش)، وضع جسمی عمومی، علائم قلبی - عروقی، علائم تنفسی، علائم معده ای - روده ای، علائم مربوط به دستگاه ادراری - تناسلی و علائم جسمی دیگر (خشکی دهان، عرق کردن) و رفتار حین مصاحبه.

اجرا و نمره گذاری

همانطور که ذکر شد، در این مقیاس، هر مورد در یک طیف ۵ نمره ای امتیاز می گیرد. نمره کلی آزمون نشان دهنده شدت اضطراب می باشد. حد اکثر نمره در هر مورد ۴ و حد اکثر نمره کلی ۵۶ می باشد. هیچ اطلاعاتی برای کمک به تعبیر و تفسیر نمره وجود ندارد، لذا برای تهیه ی نقطه برش این آزمون، باید تحقیقات دقیق بعمل آید. از طرف دیگر همانند مقیاسهای افسردگی بک و هامیلتون، از این آزمون نیز بایستی برای ارزیابی روند درمان و میزان بهبودی بیمار استفاده کرد. و تغییر نمره بیمار را در فاصله بین دو آزمون، مورد بررسی قرار داد. همچنین می توان به تحلیل محتوای موارد پرداخته و پاسخ آزمودنی به هر مورد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

اعتبار و پایایی

در تحقیقاتی که برای محاسبه اعتبار و پایایی این مقیاس بعمل آمده، همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه بک، ۰/۶۰؛ با SCL-۹۰، ۰/۷۳؛ و با ارزیابی بالینی، ۰/۷۷، گزارش شده است. (بلاک و هرسن) (۱) میز، بولر، فیلیپ، و هوسر (۱۹۸۸) گزارش کرده اند که همبستگی در حدود ۰/۶۵ بین علامت شناسی اضطراب و میزان خلق مضطرب وجود دارد.

همبستگی همگرای خلق افسرده با این مقیاس ۰/۵۹ و ۰/۷۸، و همبستگی افتراقی خلق مضطرب با آن ۰/۲۵ و ۰/۶۰ گزارش شده است، همبستگی بین مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون و پرسشنامه اضطراب بک نیز برابر ۰/۵۱ می باشد.

پایایی این آزمون توسط حق شناس (۱۳۶۹) از طریق باز آزمائی (۲)، ۰/۸۱ گزارش شده است.

نقد آزمون

نکات مثبت: اجرای آسان این پرسشنامه و توانایی استفاده از اطلاعات حاصله از مصاحبه، از نکات مثبت این آزمون بوده، و با اینکه این آزمون بایستی توسط یک مصاحبه گر و ارزیاب بالینی ماهر بکار رود، ولی به نظر نمی رسد که استفاده از آن مستلزم آموزش های زیاد و پیچیده باشد.

نکات منفی: علائم جسمی زیاد باعث می شود که اجرای آزمون در مورد افراد مبتلا به بیماری های جسمی از پایایی و اعتبار مناسبی برخوردار نباشد. برخی از موارد (مانند بی خوابی، خلق افسرده و برخی از علائم جسمی) در اختلالات خلقی دیگر نیز به اندازه حالت اضطرابی احتمال وقوع دارد. بنا بر این، این مقیاس قادر به تمایز بین حالت اضطرابی و اختلالات دیگر نمی باشد. عدم وجود اطلاعات مربوط به هنجار یابی و اطلاعات لازم برای تعبیر و تفسیر نمرات نیز یکی دیگر از انتقادات وارده به این آزمون می باشد.

بسمه تعالی

مقیاس ارزشیابی اضطراب هامیلتون

مشخصات مراجع:

نام و نام خانوادگی: _____ تاریخ تولد: _____ تحصیلات: _____ تاریخ اجر: _____

نام و نام خانوادگی آزمونگر: _____

تعریف درجات مختلف ارزشیابی

خفیف: بطور نامنظم و برای مدت های کوتاهی این رفتار از مراجع مشاهده می شود.

متوسط: بطور منظم و بادوام و برای مدت های طولانی تری این رفتار از مریض مشاهده می شود و مراجع باید کوشش و تقلای زیادی برای کنار آمدن به این شکل بکار گیرد.

شدید: رفتار مورد نظر دائماً با مراجع همراه است و تمام زندگی او را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

خیلی شدید: شدت صفت یا رفتار مورد نظر به حدی است که باعث ناتوانی کامل مراجع در مواجهه با وظایف و فعالیت های روزمره او می گردد.

توجه: ارزشیاب برای جلوگیری از هرگونه تاثیر ناخواسته از مطالعه ارزشیابی های قبلی مراجع خودداری کند

ردیف	صفت یا رفتار	توضیح و تعریف	۰ وجود ندارد	۱ خفیف	۲ متوسط	۳ شدید	۴ خیلی شدید
۱	خلق مضطرب	نگران است ، منتظر است بدترین حادثه اتفاق بیفتد ، با ترس به آینده می نگرد ، حساس است					
۲	تنش با انقباض عضلانی	احساس تنش و کشش عضلانی ، خستگی ، از جا پریدن ، به آسانی به گریه افتادن ، لرزیدن ، احساس بی قراری ، ناتوانی در استراحت و آرام گرفتن					
۳	ترس	از تاریکی ، از افراد غریبه ، از تنها ماندن ، از حیوانات ، از ترافیک ، از جاهای شلوغ					
۴	بی خوابی	اشکال در خواب رفتن ، خواب مقطوع ، خواب ناراحت همراه با خستگی به هنگام بیدار شدن ، رویا و کابوس های زیاد .					
۵	ذهنی یا شناختی	اشکال در متمرکز کردن حواس و دقت ، ضعف حافظه					
۶	خلق افسرده	از دست دادن علائق ، لذت نبردن از سرگرمی های معمولی ، افسردگی صبح ها زودتر از معمول از خواب بیدار شدن ، تغییر خلق و روحیه در طی روز					

رتبه	صفت یا رفتار	توضیح و تعریف	۰ وجود ندارد	۱ خفیف	۲ متوسط	۳ شدید	۴ خیلی شدید
۷	جسمی و عضلانی	درد و کوفتگی، خشکی حرکتی، رعشه جهش های عضلانی، بهم ساییدن دندان ها، لرزش صدا، افزایش تن صدا					
۸	بدنی و حسی	پیچیدن صدا در گوش، ضعف و تیره شدن دید، احساس ناگهانی گرمی یا سردی احساس ضعف، احساس خواب رفتگی یا مور مور شدن پوست					
۹	علائم قلبی - عروقی	پر تپشی قلب، تند شدن ضربات قلب درد و فشار روی سینه، احساس ضربان در رگها، احساس غش و از حال رفتن.					
۱۰	علائم تنفسی	احساس فشار یا گرفتگی در سینه، احساس خفگی، آه کشیدن، تنگی نفس					
۱۱	علائم گوارشی	اشکال در بلع، احساس دل درد، احساس سوزش در شکم، احساس نفخ در شکم، دل به هم خوردگی، تهوع، اسهال، یبوست، از دست دادن وزن بدن					
۱۲	علائم دستگاه تناسلی و ادرار	افزایش دفعات ادرار، احساس نیاز به دفع ادرار، قطع عادت ماهانه، عادت ماهانه دردناک، بروز سرد مزاجی، انزال زودرس، از دست دادن علاقه جنسی، ناتوانی جنسی					
۱۳	علائم سیستم عصبی خود مختار	خشکی دهان، سرخ شدن یا پریدن رنگ صورت، عرق کردن، سرگیجه، سردرد ناشی از تنش، سیخ شدن موها					
۱۴	رفتار در حین مصاحبه	وول خوردن، جا به جا شدن یا قدم زدن، لرزش دست ها، چین خوردگی ابروها، صورت در هم کشیدن، آه کشیدن یا تند تند نفس کشیدن، پریدن رنگ صورت، قورت دادن، آروغ زدن، مردمک های اتساع یافته، پرشهای عضلانی شدید، برآمدگی چشم ها					